

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		
		外 204 胃癌 SP+Tmab 3回目以降 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		エスワン処方 14日分 体表面積で変更		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL 8mL 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ---①		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスネツピタント静注235mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 236ml/h 注入時間 30分 ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 トラスツズマブS注 6mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★前回異常がなければ、60分に短縮可 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン マンニトールS注射液 300mL 1袋 1日1回 点滴速度 300ml/h 注入時間 1時間 ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ★全量500mLに合わせる ---⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ---⑥		
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日1回 朝食後 3日分 抗がん剤翌日より内服	
		エスワン処方 体表面積で変更		

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が細くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5～8回/日点眼する。(エスワン)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(エスワン)
- 発熱、悪寒(インフルエンザウイルス感染) …… 点滴中～投与後24時間以内に発現する。(トラスツズマブ)
- 心機能低下 …… 繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査などを行う。(トラスツズマブ)
- 腎機能障害 …… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)