

		1病日	2病日	3病日	21病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目			
		内 95 肺癌 カルセド単独療法			
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1袋 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1袋 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1袋 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★①の制吐剤終了後フラッシュ ---②	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★①の制吐剤終了後フラッシュ ---②	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★①の制吐剤終了後フラッシュ ---②	
		実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 アムルピシン注射用 45mg/m ² 1日1回 ★全開で ★投与側の腕を温める ---③	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 アムルピシン注射用 45mg/m ² 1日1回 ★全開で ★投与側の腕を温める ---③	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 アムルピシン注射用 45mg/m ² 1日1回 ★全開で ★投与側の腕を温める ---③	
		実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---④	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---④	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---④	
	一般注射				

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。