

		1日目	2日目	14日目
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	休業完了14日目		
		外 162 乳癌 dose dense EC がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		★JMSネオシールドシステム使用★		
		ヘクフルグラスタムの投与指示確認		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスネツピタント静注235mg 1瓶 ファモチジン注射液20mg 2mL 1A d-クルルフェニラミン注5mg 0.5%1mL 1A 1日1回 点滴速度 236ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★バックアダプタ装着★ ☆カ イソカク + 7ml輸液セット使用☆ ★フラネクタ 2個 使用 ★		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 ※自然滴下用輸液セット使用※ ★①の点滴の側管より同時に全開で ★②は後で比 比 比 投与に使用★ ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 注射用シクロホスファミド 600mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★バックアダプタ装着★ 注入時間 1時間 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚糖液5% 100mL 1瓶 エビルピシン注 90mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★シクロホスファミドの側管より同時に全開で ★投与側の腕を温める ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★エビルピシン終了後全開で ★終了後もラインははずさない★ ---⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★バックアダプタ装着★ ---⑥		
		一般注射		
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日1回 朝食後 4日分 抗がん剤点滴翌日より内服	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 出血性膀胱炎 …… 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)