

		1病日	2病日	21病日
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	休業完了21日目		
		外 32 乳癌 EC がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		★JMSネオシールドシステム使用★		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスネツピタント静注235mg 1瓶 ファモチジン注射液20mg 2mL 1A d-クロルフェニラミン注5mg 0.5%1mL 1A 1日1回 点滴速度 230ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★バックアダプタ装着★ ☆スパイクネキ + 7針輸液セット使用☆ ★ブラネクタ 2個 使用 ★		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 ※自然滴下用輸液セット使用※ ★①の点滴の側管より同時に全開で ★ルトは後でエビリン投与に使用★ ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 注射用シクロホスファミド 600mg/m ² 1日1回 ★バックアダプタ装着★ 注入時間 1時間 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚糖液5% 100mL 1瓶 エビルピシン注 90mg/m ² 1日1回 ★シクロホスファミドの側管より同時に全開 ★投与側の腕を温める ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★エビルピシン終了後全開で ★終了後もラインははずさない★ ---⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★バックアダプタ装着★ ---⑥		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日1回 朝食後 4日分 抗がん剤点滴翌日より内服	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 出血性膀胱炎 …… 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)