

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		
		外 173 乳癌 DS-8201a がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスネツピタント静注235mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 236ml/h 注入時間 30分 ---① ★パル輸液セット使用★ ☆ルートは遮光不要☆		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ---② ★パル輸液セット使用★		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 トラスツズマブ デルクステカン点滴静注用 5.4mg/kg 注射用水PL「フソー」 20mL 1A 1日1回 注入時間 1時間30分 前回異常なければ、30分まで短縮可 ---③ ↓ ★パル輸液セット使用★ ★★点滴バックを遮光すること★★ ☆ルートは遮光不要☆		
	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 12分 ---④			
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日1回 朝食後 3日分 抗がん剤点滴翌日より内服	

発熱、悪寒(インフルエンザリアクション)……………点滴中～投与後24時間以内に発現する。(トラスツズマブ デルクステカン)
 心機能低下 …………… 繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査などを行う。(トラスツズマブ デルクステカン)
 間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。(トラスツズマブ デルクステカン)