

		1病日	2病日	21病日
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	● 休業完了21日目		
		外 137 胃癌 XP がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		● カベシタピン処方 14日分 体表面積で変更		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL 8mL 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ---①		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスネツピタント静注235mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 236ml/h 注入時間 30分 ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン D-マンニトール/D-ソルビトール注射液 300mL 1袋 1日1回 点滴速度 300ml/h 注入時間 1時間 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ★全量500mLに合わせる ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ---⑤		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日1回 朝食後 3日分 抗がん剤点滴翌日より内服	
		● カベシタピン処方 体表面積で変更 外来処方：別		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 腎機能障害 …… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベシタピン)