

		1病日	14病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14日目	
		外 05 膵臓癌 GEM単独 隔週	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 206ml/h 注入時間 30分 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★投与側の腕を温める ---③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h フラッシュ用 注入時間 5分 ---④	
	一般注射		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。