

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		
		外 213 胃癌 Zolbe+Cape		
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		カベシタピン処方 14日分 体表面積で変更		
		ピロイの投与速度は主治医、薬剤師と協議してください		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間通確認 ---①		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ルート確保用 ---②		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスナツピタント静注235mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注 0.5%1mL 1A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 240ml/h 注入時間 30分 ---③		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン テルモ生食 500mL 1袋 ソルベツキシマブ点滴静注用 600mg/ml 注射用水PL「フソー」 20mL 3A 1日1回 ☆最終濃度は20mg/mLに調製 ★投与速度は主治医に確認★ ---④		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ソルベツキシマブの最終点滴速度のままでフッソ ---⑤		
		実施確認：未・ ワンショット中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 CVポート、セブタム洗浄用 ---⑥		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 1錠 1日1回 朝食後 3日分	
		カベシタピン：14日分 体表面積参照にて処方		

□副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベシタピン)
発熱、悪寒(インフュージョンリアクション) …… 点滴中～投与後24時間以内に発現する。(ソルベツキシマブ)