

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		
		外 209 胃癌 Zolbe+G-XELOX_2回目以降		
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		カベシタピン処方 14日分 体表面積で変更 ピロイの投与速度は主治医、薬剤師と協議してください		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間確認 ---①		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ルート確保用 ---②		
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ハロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスネツピタット静注235mg 1瓶 チキサメタソン注射液3.3mg 1mL 3A ドークロルフェニラミンマレイン酸塩注 0.5%1mL 1A ファミチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 242ml/h 注入時間 30分 ---③		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン テルモ生食 500mL 1袋 ソルベツキシマフ点滴静注用 600mg/ml 注射用水PL「フソー」 20mL 3A 1日1回 ☆最終濃度は2.0mg/mLに調製 ★投与速度は主治医に確認★ ---④		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ソルベツキシマフの最終点滴速度のままでワッパ ---⑤		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 ---⑥		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 フラッシュ用 ---⑦		
		実施確認：未・ ワンショット中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 CVポート、セプタム洗浄用 ---⑧		
	一般注射			
処方	処方		チキサメタソン錠4mg 2錠 1日1回 朝食後 3日分	
		カベシタピン：14日分 体表面積参照にて処方		

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベシタピン)
- 発熱、悪寒(インフルエンザアクション) …… 点滴中～投与後24時間以内に発現する。(ソルベツキシマフ)
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)