

		1病日	2病日	3病日	14病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14病日 外 208 胃癌 Zolbe+mFOLFOX6_初回 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 ピロイの投与速度は主治医、薬剤師と協議してください			
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間経過確認 ---① 実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ---② ルート確保用 ルートは後でレボホリナート投与に使用 実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 ホスナツピタント静注235mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注 0.5%1mL 1A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 242ml/h 注入時間 30分 ---③ 実施確認：未・ 中心静脈 メイン テルモ生食 500mL 1袋 ソルベツキシマブ点滴静注用 800mg/ml 注射用水PL「フソー」 20mL 4A 1日1回 ☆最終濃度を2.0mg/mLに調製 ★投与速度は主治医に確認★ ---④ 実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ソルベツキシマブの最終点滴速度のままで7分 ---⑤ 実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 85mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 レボホリナートと同時に投与 ---⑥ 実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚糖液5%250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 材料A アナと同時に投与 ---⑦ 実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 5-FU注 400mg/ml 1日1回 注入時間 5分 急速投与 ---⑧ 実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 20mL 5-FU注 2400mg/ml 1日1回 注入時間 46時間 ---⑨ インフューザーポンプ ★5-FU投与量別希釈表参照★ 携帯ポンプ			
	一般注射			ワンシヨット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A	
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日1回 朝食後 3日分	⇒	

□副作用への対応
 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いというがいを頻回に行う。
 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
 手足症候群 …… 予防のために保護剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベシタピン)
 発熱、悪寒(インフルエンザやカンジダ) …… 点滴中～投与後24時間以内に発現する。(ソルベツキシマブ)
 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(オキサリプラチン)
 アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)