

		1病日	8病日	15病日	22病日	28病日
休薬完了	休薬完了					休薬完了
文書作成	文書	休薬完了28日目	リツキシマブ投与30分前：抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用	リツキシマブ投与30分前：抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用	リツキシマブ投与30分前：抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用	
		内 262 非ホジキンリンパ腫 R2(1コース)				
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書				
		リツキシマブ投与30分前：抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用				
		レナリドミド処方 (day1~21)				
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注射用100mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ☆内服前投薬あり☆	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注射用100mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ☆内服前投薬あり☆	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注射用100mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ☆内服前投薬あり☆	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注射用100mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ☆内服前投薬あり☆	
		実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] テルモ生食 500mL 1袋 リツキシマブBS点滴静注 375mg/m ² 1日1回 ★投与速度は主治医に確認★ ---②	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] テルモ生食 500mL 1袋 リツキシマブBS点滴静注 375mg/m ² 1日1回 ★投与速度は主治医に確認★ ---②	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] テルモ生食 500mL 1袋 リツキシマブBS点滴静注 375mg/m ² 1日1回 ★投与速度は主治医に確認★ ---②	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] テルモ生食 500mL 1袋 リツキシマブBS点滴静注 375mg/m ² 1日1回 ★投与速度は主治医に確認★ ---②	
		実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	実施確認：未・ 持続末梢メイボ [®] ソ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
処方	処方	レナリドミド20mg処方(day1-21)				

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。