

		1病日	28病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	☑ 休薬完了28日目	
		内 262 非ホジキンリンパ腫 R2(2-5コース)	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
		☑ リツキシマブ投与30分前：抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用	
		☑ レナリドミド処方 (day1~21)	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 持続末梢M1泳 <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 100mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注射用100mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ☆内服前投薬あり☆	
		実施確認：未・ 持続末梢M1泳 <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> テルモ生食 500mL 1袋 リツキシマブBS点滴静注 375mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★投与速度は主治医に確認★ ---②	
		実施確認：未・ 持続末梢M1泳 <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
処方	処方	☑ レナリドミド20mg処方(day1-21)	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。