

		1病日	28病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了28日目	
		婦人科90 Oraparib+Durva がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書 ※体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★パル輸液セット使用★ ---①	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 デュルバルマブ点滴静注 1500mg 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用★ ---②	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
	一般注射		
処方	処方	(day1-28)オラパリブ内服	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。