

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目	
		婦人科89 TC+Durva	
		がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書	
		アルコール過敏症確認	
		※体重30kg以下の場合はDurvaの1回投与量は20mg/kgとする	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 持続末梢バイパス 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★バル輸液セット使用★ ★レスタミンコーワ内服確認 ---①	
		実施確認：未・ 持続末梢バイパス 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg/5mL 1瓶 ホスネツピタント静注235mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 5A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 244ml/h 注入時間 30分 ---② ↓ ↓ ★バル輸液セット使用★	
		実施確認：未・ 持続末梢バイパス 大塚生食注 250mL 1袋 デュルバルマブ点滴静注 1120mg 1日1回 注入時間 1時間 ★バル輸液セット使用★ ---③	
		実施確認：未・ 持続末梢バイパス 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★バル輸液セット使用★ ---④	
		実施確認：未・ 持続末梢バイパス テルモ生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 175mg/m ² 1日1回 注入時間 3時間 ★バル輸液セット使用★ ---⑤	
		実施確認：未・ 持続末梢バイパス 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン注 AUC=5 1日1回 注入時間 1時間 ---⑥	
		実施確認：未・ 持続末梢バイパス 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---⑦	
	一般注射		
処方	処方	シフェンヒドラミン錠10mg 5錠 1日1回	

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患	息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
大腸炎	腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
1型糖尿病	口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
神経障害	手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
皮膚障害	体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
内分泌障害	倦怠感が発現することがある。
末梢神経障害	治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(パクリタキセル)
関節痛・筋肉痛	点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(パクリタキセル)
アレルギー反応	治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患	息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
大腸炎	腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
1型糖尿病	口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
神経障害	手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
皮膚障害	体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
内分泌障害	倦怠感が発現することがある。